

Бешенство

- смертельно опасное инфекционное заболевание животных и человека

ВИРУС БЕШЕНСТВА

поражает мозг человека,
попадает в кровь
через слюну больного
животного при укусах



Уважаемые владельцы домашних животных!

Напоминаем, что весь 2020 год у нас проходит бесплатная вакцинация животных против бешенства по средам с 9:00 до 16:00

Ждем ваших любимцев на прививку по адресу ул. Колхозная д.2

Напоминаем, что за 10 дней до предполагаемой даты прививки необходимо обработать животное от гельминтов. На территории района вакцинация против бешенства проводится участковыми ветеринарными специалистами.

Дополнительная информация по телефону 8 (3473) 92-22-80

Проявление заболевания у животных

- Вирус БЕШЕНСТВА появляется в слюне зараженного животного за 7-10 дней до появления у него признаков болезни, поэтому человек может заболеть от укуса внешне здорового животного.
- В начале заболевания животное прячется, избегает людей, либо ластится, пытается лизнуть.
- В разгар болезни больные животные чаще всего возбуждены, бросаются на окружающих, хватают предметы, стремятся сорваться с привязи. У них обильно выделяется слюна.
- Болезнь развивается стремительно.
- В последней стадии животное не двигается, погибает в состоянии комы.

Первые признаки болезни у человека

- Всегда начинаются с места укуса: возникает зуд, тянущие боли.
- Появляется общая слабость, головная боль, чувство тревоги, тоски, страха смерти.
- Затем появляются симптомы поражения мозга (водобоязнь, светобоязнь).
- В дальнейшем один только вид жидкости, шум воды, резкое движение, яркий свет приводит к приступу, сопровождающемуся спазмом глотки, судорогами мышц.
- Если больной не погибает в период возбуждения, то смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца.
- Эффективного лечения от бешенства при развитии картины болезни нет.

Что делать при укусе ?

- В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ интенсивно промыть место укуса струей мыльной воды
- КРАЯ РАНЫ ОБРАБОТАТЬ 70% спиртом или настойкой йода
- ОБРАТИТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЙ ТРАВПУНКТ, пройти курс прививок антирабической вакциной или иммуноглобулина не позднее 14 дня после укуса.

Основные переносчики инфекции:



ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ –

лисы, волки, енотовидная собака, ежи, летучие мыши



ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ – в основном собаки и кошки

